

# Chiba Campaign 2023

November 24-December 8, 2023

Fumitoshi Kawasaki



2023/11/27

# **Atmospheric Indices**

# 観察対象

	種別	計算方法	目安
<b>Lifted index</b>	大気の鉛直安定度	500hPaの気温と、地上～500mで平均した空気塊を500hPaまで断熱的に持ち上げたときの空気塊の気温との差	> 0 : 安定 0～-3 : やや不安定 -3～-6 : 中程度に不安定 -6～-9 : 非常に不安定 -9未満 : 極端に不安定
<b>Showalter index</b>	大気の鉛直安定度	500hPaにおける気温と850hPaの空気塊を断熱的に「持ち上げ凝結高度」まで持ち上げ、そこから湿潤断熱的に500hPaまで持ち上げた時の空気塊の温度との差	>0 : 安定 0～-3 : やや不安定 (雷雨の可能性あり) -3～-6 : 中程度に不安定 (激しい雷雨の可能性あり) -6～-9 : 非常に不安定 <-9 : 極度に不安定
<b>K index</b>	大気の鉛直安定度	$K \text{ index} = (T_{850} - T_{500}) + TD_{850} - (T_{700} - TD_{700})$ ※ $T_{850}$ : 850hPaの気温 $TD_{850}$ : 850hPaの露点温度	雷雨の可能性 : 15以下 : なし 15-20 : 20% 21-25 : 20-40% 26-30 : 40-60% 31-35 : 60-80% 36-40 : 80-90% 40以上 : ほぼ100%
<b>SWEAT index</b>	激しい雷雨の発生しやすさ	$SWEAT \text{ index} = 12.0 \times \max((T_{d850} (\text{°C}), 0.0) + 20.0 \times \max(TT - 49.0, 0.0) + 2.0 \times \text{skt}_{850} + \text{skt}_{500} + 125.0 \times \text{shear}$ ※ $\text{skt}_{850}$ : 850hPa風速(kt) $\text{skt}_{500}$ : 500hPa風速(kt) $\text{shear} = (\sin(\text{DIR}_{500\text{hPa}} - \text{DIR}_{850\text{hPa}}) + 0.2)$	>300 : 激しい雷雨の可能性あり >400 : 竜巻の可能性あり ※地域性に注意して使う必要がある。主として米国で使われる。

# 結果 (場所：つくば 観測機器：ラジオゾンデ)

2023/08/01 – 2023/08/15 (夏)  
(比較用)

2023/11/24 – 2023/11/26 (冬)  
(Chiba-Campaign期間)

